

4	Близкие родственники или родители страдают (страдали) психическими заболеваниями									
5	Родители или близкие родственники имели судимость									
6	Неприятное отношение к родителям									
7	Плохие взаимоотношения в семье									
8	Чрезмерно строгое воспитание									
9	Чересчур мягкое («тепличное») воспитание									
10	Безнадзорность									
11	Побеги из дома									
12	Отец (мать) злоупотреблял(а) спиртными напитками									
13	Отец (мать) лечился(ась) от алкоголизма									
14	Тяжелые жилищно-бытовые условия									
15	Очень низкая успеваемость в школе									
16	Значительные нарушения дисциплины в школе									
17	Замкнутость, боязнь выступлений перед аудиторией									
18	Значительные и частые конфликты с товарищами									
19	Нарушения производственной дисциплины (опоздания, прогулы ...)									
20	Значительные и частые конфликты с товарищами по работе									
21	Низкая работоспособность, быстрое наступление усталости									
22	Систематическое употребление алкоголя									
23	Признаки алкоголизма									
24	Раннее начало употребления алкоголя (в 13-15 лет)									
25	Раннее начало курения (в 13 - 15 лет)									

46	Имелись тяжелые травмы головы с потерей сознания									
47	Повышенная утомляемость									
48	Расстройства сна (длительное засыпание, поверхностный сон, частые пробуждения ночью, устрашающие сновидения)									
49	Ощущение усталости и вялости по утрам									
50	Сонливость днем									
51	Нетерпеливость, непоседливость, суетливость									
52	Раздражительность, вспыльчивость									
53	Головные боли									
54	Головокружения									
55	Обмороки, потеря сознания									
56	Судорожные припадки									
57	Перенесенные инфекции нервной системы									
58	Преобладание беспричинно плохого настроения									
59	Преобладание беспричинно приподнятого настроения									
60	Беспричинные периодические перемены настроения									
61	Плаксивость									
62	Частые ощущения «комка» в горле									
63	Трудности сосредоточения внимания									
64	Плохая память									
65	Навязчивости									
66	Страхи									
67	Частые сомнения в правильности выполненных действий (закрыл ли дверь, выключил ли свет ...)									
68	Снохождение									
69	Энурез (ночное недержание мочи)									

70	Раннее начало половой жизни								
71	Беспорядочные и многочисленные половые связи								
72	Повышенный интерес к сексуальным вопросам								
73	Чрезмерная фиксация внимания на вопросе о верности подруги								
74	Сведения о половых извращениях								
75	Отсутствие элементарных знаний								
76	Непонимание сущности явлений								
77	Малый запас слов								
78	Примитивность суждений								
79	Очень низкая успеваемость в школе								
80	Развязанное поведение								
81	Враждебное отношение к проводящему беседу								
82	Замкнутость								
83	Нерешительность, робость								
84	Усталый, угнетенный вид у испытуемого								
85	Нетерпеливость, суетливость								
86	Заикание								
87	Тик, дрожание, судорожное подергивание мышц								
88	Недостатки артикуляции (косноязычие, шепелявость)								
89	Неловкость, угловатость движений								
	Общее количество фактов фиксации («+»)								

В ходе беседы наличие признака отмечается в соответствующей графе знаком «+».

Ключ

При обработке результатов подсчитывается общее количество «+» в графе номера, соответствующего конкретному человеку.

Интерпретация

Если общая сумма фактов фиксации признаков нервно-психической неустойчивости (знаков «+») превышает 45 ед. – данный обследуемый требует особого контроля и внимания в ходе последующего наблюдения и изучения документов с целью выявления у него признаков нервно-психической неустойчивости.

Если общая сумма фактов фиксации признаков нервно-психической неустойчивости (знаков «+») более 60 ед. – данный обследуемый явно имеет признаки нервно-психической неустойчивости и заносится в списки для последующего углубленного обследования психологом.

Если общая сумма фактов фиксации признаков нервно-психической неустойчивости (знаков «+») превышает 75 ед. – данного обследуемого требуется представить на обследование к невропатологу (психиатру) по причине ярко выраженных признаков нервно-психической неустойчивости.

Примечание: Если у обследуемого в последние 2-3 года были черепно-мозговые травмы с потерей сознания, то он сразу относится к категории лиц с признаками нервно-психической неустойчивости, при этом беседа продолжается для выявления дополнительных признаков, влияющих на особенности проявления НПН у данного обследуемого.